Notice scientifique

1. DENOMINATION
PORCILIS ERY-PARVO

2. COMPOSITION
Erysipelothrix rhusiopathiae (souche M2 sérotype 2) inactivé ≥ 50 UI - Parvovirus porcin (souche PPV 014) inactivé ≥ 9 log 2 HI-dl-α-Tocophérol acétate - Polysorbate 80 - Simethicone - NaCl - Formaline - Tris aminomethane - Aq. pro inj. - pro dos. un. (2 ml).

3. FORME PHARMACEUTIQUE
Vaccin inactivé en suspension aqueuse pour injection i.m.

4. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
Le principe actif contre le rouget est un lysat cellulaire d'E. rhusiopathiae, souche M2, sérotype 2, qui induit une immunité contre le rouget (sérotypes 1 et 2) chez le porc.
Le principe actif contre la parvovirose porcine est la souche 014 du PPV inactivée par bêta-propiolactone. L'immunité produite garantit que les embryons et les foetus ne seront plus infectés. Les antigènes sont administrés dans un adjuvant aqueux qui ne provoque pas de réaction tissulaire à l'endroit de l'injection. En ajoutant un adjuvant, on obtient une réponse immunitaire élevée qui persiste au moins six mois.

5. DONNEES CLINIQUES

5.1 Espèce animale
Porc.

5.2 Indications thérapeutiques
Immunisation active des truies et des primipares contre le rouget et protection de leurs embryons et de leurs foetus contre l'infection par le parvovirus porcin pendant la gestation.

5.3 Contre-indications
Aucune connue si le produit est utilisé suivant les recommandations. Ne vacciner que des animaux en bonne santé.

5.4 Effets indésirables
Après la vaccination, un certain nombre d'animaux peut présenter une légère fièvre passagère accompagnée d'une apathie et d'un gonflement temporaire à l'endroit de l'injection. Ces effets secondaires disparaîssent endéans 1-4 jours après la vaccination.

5.5 Précautions particulières
Avant de vacciner, porter le vaccin à température ambiante (entre 15° C et 25° C). Utiliser uniquement du matériel d'injection stérile. Bien agiter avant et pendant l'emploi.

5.6 Utilisation en cas de gestation et de lactation
Porcilis Ery-Parvo peut être utilisé pendant la gestation.

5.7 Interactions
Aucune connue.

19 JAN. 2006

5.8 Posologie et mode d'emploi

Dose : 2 ml par animal.

Vaccination de base :

Immunisation des primipares contre E. rhusiopathiae et le parvovirus porcin (PPV) avant la première saillie. Une seule injection au plus tard 2 semaines avant la saillie suffit pour protéger la gestation suivante contre une infection par le PPV. Pour l'immunisation contre le rouget, 2 injections sont nécessaires. Pour cela, on peut utiliser Porcilis Ery-Parvo ou le vaccin monovalent Porcilis Ery 4 semaines avant ou après l'administration de Porcilis Ery-Parvo.

Revaccination :

---

1 dose pendant chaque période de lactation, au plus tard 2 semaines avant la saillie.
Injecter en intramusculaire profonde derrière l'oreille.

5.9 Surdosage

Aucun symptôme pathologique particulier n'a été observé après injection d' une double dose.

5.10 Mise en garde spéciale

Aucune connue, si le vaccin est utilisé suivant les recommandations.

5.11 Temps d'attente

Viande : nihil.

5.12 Mesures de sécurité spéciales pour personnes

Aucune connue, si le vaccin est utilisé suivant les recommandations.

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1 Incompatibilités

Aucune connue. Ne pas mélanger avec d'autres vaccins.

6.2 Stabilité

24 mois. Voir date de péremption sur l'emballage, précédée par "Ex.:".
Pour garantir la stérilité, tout flacon ponctionné doit être utilisé dans les 10 heures.

6.3 Conservation

A l'obscurité entre +2° C et +8° C. Ne pas congeler.

6.4 Présentation

10, 25, 50 ou 125 doses dans un flacon en verre ou en PET de 20, 50, 100 ou 250 ml.

6.5 Détenteur de l'enregistrement/Fabricant

Intervet International B.V. - 5830 AA Boxmeer - Pays-Bas representé par
INTERVET BELGIUM S.A. - Bedrijvenlaan 7 - 2800 Mechelen
Distributeur : Intervet Belgium S.A.

6.6 Produits non utilisés

Des précautions particulières doivent être prises, afin que le produit ne se retrouve pas dans l'environnement.

7. DELIVRANCE

Sur ordonnance vétérinaire.

19 JAN. 2006